



Instituto Nacional  
de Cancerología-ESE  
Colombia  
Por el control del cáncer


# Cáncer de cuello uterino

## ¿Conoce usted su riesgo?



Virus del Papiloma Humano (VPH) principal infección de transmisión sexual

Alrededor del **70% - 80%** de los adultos que han tenido vida sexual, adquieren el VPH



No todas las mujeres infectadas con VPH desarrollan cáncer, pero todas las mujeres con cáncer de cuello uterino, han tenido el virus



Hay más de 100 tipos de VPH. Los tipos **16 y 18** son los responsables de casi el **70%** de los cánceres de cuello uterino



Cada año en Colombia más de **5.000** nuevos casos de cáncer de cuello uterino y más de **2.000** muertes



**Segunda** causa de muerte por cáncer en las mujeres en Colombia

En **Colombia** es gratuita para niñas escolarizadas de **9 a 17** años

Es **segura**, se han aplicado más de **170 millones de dosis** en todo el mundo

**Preferiblemente** debe ser aplicada en mujeres que **no han** iniciado vida sexual

**Prueba de inspección visual** con ácido acético y lugol

Es eficaz especialmente para **mujeres de regiones apartadas** con difícil acceso a la salud

Mujeres entre los **30 y 50** años



- Permite **identificar el riesgo de cáncer** antes que se presente
- Está **incluida en el POS**
- Recomendada para mujeres entre **30 a 65** años de edad, en intervalos de cada cinco años, cuando los resultados han sido negativos

- Mujeres **menores de 30** años
- Realizarla **cada 3 años**, si los resultados son negativos